مهارات التفكير العليا

قاعدة السلسلة

تبرير: إذا كان الاقتران: $y = \ln(ax + b)$ ، حيث a و b ثابتان موجبان، وكان ميل المماس لمنحنى الاقتران عند النقطة P هو 1 ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تباعاً:

(42) أثبت أن الإحداثي x للنقطة P أقل من 1

y=ln (ax+b)dydx=aax+b

ليكن P إحداثيا هما (x_1, y_1)، فيكون ميل المماس عند P هو:

dydx|x=x1=aax1+b→aax1+b=1→a=ax1+b→x1=a−ba=1−ba

المقدار 1 -ba أقل من 1 ؛ لأن ba مقدار موجب كون a , b موجبين.

(43) أجد إحداثيي النقطة التي يكون عندها ميل المماس 12 ، علماً بأن P هي النقطة (0, 2)، ثم أبرر إجابتي.

P(x1,y1)=(0,2)x1=1−ba=0→b=ay1=ln(ax1+b)→2=ln(b)→b=e2→a=e2

بتعويض قيمتي a , b في قاعدة الاقتران ينتج أن:

y=ln (e2x+e2)=ln e2(x+1)=ln e2+ln (x+1)=2+ln (x+1)

dydx = 1x + 1 ميل المماس هو: وهذا يساوي 12

إذن: 1x + 1 = 12

أي أن: $x + 1 = 2$

إذن: $x = 1$ و $y = 2 + \ln 2$

النقطة التي يكون ميل المماس عندها هي $(1, 2 + \ln 2)$.

تبرير: يعطى منحنى بالمعادلة الوسيطية: $x = t^2$, $y = 2t$:

(44) أجد dydx بدلالة t .

dydt=2,dxdt=2tdydx=dydtdxdt=22t=1t

(45) أجد معادلة العمودي على المماس المنحنى عند النقطة $(t^2 , 2t)$.

ميل المماس:

m=dydx=1t

ميل العمودي على المماس:

m=−11t=−t

معادلة العمودي على المماس:

y−2t=−t(x−t2)→y=−tx+t3+2t

(46) أثبت أن مساحة المثلث المكون من العمودي على المماس، والمحورين الإحداثيين، هي 12|2(2+t2)|t| .

لإيجاد المقطع للعمودي على المماس نضع $y = 0$ x

0=−tx+t3+2t→x=t3+2tt=t2+2

لإيجاد المقطع للعمودي على المماس نضع $x = 0$ y

y=−t(0)+t3+2t=t3+2t

مساحة المثلث:

A=12|t2+2||t3+2t|=12|t2+2||t(t2+2)|=12|t(t2+2)2|=12|t|(t2+2)2